

## قارچهای جدا شده از چای در شمال ایران

سید عبدا... میرحسینی مقدم<sup>۱</sup>، جعفر ارشاد<sup>۲</sup> و جلال فاتحی<sup>۳</sup>

۱- بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان، رشت

۲ و ۳- بخش تحقیقات گیاهشناسی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، تهران

براساس آخرین آمار، سطح زیر کشت چای در ایران بالغ بر ۴۰۰۰۰ هکتار می باشد که اکثراً در استان گیلان متمرکز است. طی سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ ضمن بازدید از باغها و خزانه های چای از روی برگ آنها قارچهای *Acremonium cf. furcatum*, *A. alternata*, *Alternaria sp.*, *Phyllosticta theae*, *Colletotrichum gloeosporioides*, *Botrytis cf. cinerea*، *Sclerotinia longiseta*, *P. theae*, *Pestalotiopsis guepini* و از روی طوقه و ریشه، قارچهای *Fusarium solani*, *Lasiodiplodia theabromae*، *Rosellinia sp.* و *Sclerotium rolfsii*, *Cyrtospora cf. hypodermia sp.* جدا شدند.