

بررسی و تعیین مناسبترین زمان گرده افشاری در خرمای شاهانی.

حمید زرگری<sup>۱</sup>، خدابخش پناهی<sup>۲</sup>

۱- ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم

۲- مؤسسه تحقیقات خرما و میوه های گرسیری کشور، اهواز

جهت تعیین مناسبترین زمان گرده افشاری به منظور بدست آوردن حداکثر محصول در خرمای شاهانی آزمایشی بصورت بلوکهای کامل تصادفی با ۷ تیمار شامل: گرده افشاری بلافصله پس از باز شدن غلاف و شش تیمار دیگر گرده افشاری ۱۴۴، ۱۲۰، ۹۶، ۷۲، ۴۸، ۲۴ ساعت پس از باز شدن غلاف می باشد، هر تیمار دو خوش و در چهار تکرار جمعاً بر روی ۱۴ اصله خرمای شاهانی به مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم به مرحله اجرا درآمد. برای گرده افشاری از دستگاه گرده افشاری مکانیکی و از گرده پایه شاهانی استفاده شد که نتایج حاصل بعد از تجزیه و تحلیل آماری نشانگر آن است که مناسبترین زمان گرده افشاری در خرمای شاهانی دو تا چهار روز بعد از باز شدن اسپات گل آذین ماده است و تا چهار روز بعد از باز شدن اسپات تفاوت چندانی در میزان تلقیح و تشکیل میوه ندارد. ولی از روز چهارم به بعد موجب کاهش درصد میوه و عملکرد گردید و اقتصادی نمی باشد.