

بررسی و تعیین مناسبترین زمان گرده افشاری خرمای استعمران
همایون سیاح پور
کارشناس موسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری

این بررسی بر روی ۵ درخت استعمران در قالب طرح مریع لاتین به مدت ۲ سال در ۵ تکرار و ۵ سطح تیماری روی خوشه هر درخت اعمال شد که شامل

تیمار ۱: گرده افشاری هنگام شکاف غلاف

تیمار ۲: ۲۴ ساعت پس از باز شدن غلاف

تیمار ۳: ۴۸ ساعت پس از باز شدن غلاف

تیمار ۴: ۷۲ ساعت پس از باز شدن غلاف

تیمار ۵: ۹۶ ساعت پس از باز شدن غلاف

پس از حدود سه هفته که تشخیص میوه‌های شیطی امکان‌پذیر است شمارش انجام گردید. نتایج سال اول و دوم و تجزیه مرکب حاکی است که بین زمانهای مختلف گرده افشاری (تیمارها) اختلاف معنی داری مشاهده نمی‌گردد و گرده افشاری را می‌توان طبق آزمون این طرح از هنگام شکاف خوردن غلاف تا حد اکثر ۹۶ ساعت بعد انجام داد البته از ۴۸ ساعت پس از باز شدن غلاف رشته‌ها به خوبی پدیدار می‌شوند قبل از آن تیاز می‌باشد غلافها توسط دست بیشتر باز گردند که در مورد درختان بلند بسیار مشکل می‌باشد.