

بررسی مقدماتی ریزش گلهای ماده گردو (*Juglans regia* L.) در ایران

حسین مرادی<sup>۱</sup>، محمد صالحی شریعت پناهی<sup>۲</sup>، علی وزوائی<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup>- مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال و بختیاری، شهرکرد

<sup>۲</sup> و <sup>۳</sup>- گروه باستانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج

این تحقیق در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ در کلکسیون گردوبی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر واقع در کمال آباد کرج و آزمایشگاههای گروه باستانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت. در سال دوم طرح در کلکسیونهای گردوبی مشهد، شاهroud و ارومیه نیز در ارتباط با ریزش گلهای ماده مشاهداتی صورت گرفت. بمنظور بررسی و ثبت میزان ریزش گلهای ماده از زمان ظهور گلها تا یک ماه پس از گلدھی تعداد گلهای و میوه‌های جوان شمارش و خصوصیات آنها یادداشت شد. ریزش گلهای ماده گردو در باغهای تحت بررسی به میزان بسیار بالائی وجود داشت. میانگین میزان ریزش گلهای ماده در مناطق، سالها و ژنتیپهای مختلف دارای تفاوت‌های معنی داری بود. دامنه ریزش از صفر تا ۹۸٪ در بین ژنتیپهای مختلف متفاوت بود. بین میزان ریزش گلهای ماده، شاخص گلدھی، تراکم شاتونها و تراکم نقاط رشد همبستگی‌های ضعیفی بدست آمد. بین میزان عناصر غذائی در برگ درختان با ریزش شدید و ریزش کم تفاوتی مشاهده نشد.