

بررسی وضعیت علفهای هرز باغات و خزانه‌های مرکبات جنوب استان فارس
محمد فردون پور^۱، امیر رضا توکلی^۲

- ۱- بخش تحقیقات آفات و بیماریهای نباتی معاونت مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، داراب
۲- بخش تحقیقات مرکبات، معاونت مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، داراب

طی یک بررسی ۲ ساله نسبت به جمع آوری و شناسایی علفهای هرز باغات و خزانه‌های مرکبات شهرستانهای داراب، چهرم و فسا در جنوب فارس و تعیین درصد پراکنش علفهای هرز غالب این باغات اقدام گردید.

طی این بررسی ۵۲ گونه علف هرز از ۴۲ جنس و ۲۳ خانواده جمع آوری گردید، علفهای هرز غالب مورد بررسی عبارت بودند از:

- | | |
|---|-----------|
| 1. <u>Cynodon dactylon</u> (L.) pers . | مرغ |
| 2. <u>Cyperus rotundus</u> L. | اویارسلام |
| 3. <u>Conyza bonariensis</u> (L.) Cronq . | پیریهار |

و علفهای هرز غالب خزانه‌های مرکبات به شرح زیر تشخیص داده شد

- | | |
|--|-----------|
| 1. <u>Cynodon dactylon</u> (L.) pers . | مرغ |
| 2. <u>Cyperus rotundus</u> L. | اویارسلام |
| 3. <u>Echino chloa col onum</u> | سوروف |
| 4. <u>Sonchus oleraceus</u> L. | شیرتیغی |