

همبستگی صفات مختلف ژنتیپ‌های گردوی ایرانی

در شمال غرب ایران (منطقه خلخال)

هادی ذبیحی (۱)، سعید پیری (۲)، علی اکبر ایمانی (۳) و فرزام توانکار (۴)

۱- دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد واحد ابهر، ۲- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ابهر، ۳- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل، ۴- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد خلخال

گردوی ایرانی (*Juglans regia* L.) در شمال غرب ایران (استان اردبیل) در مناطق مختلف از نقاط کم ارتفاع تا مناطقی با ارتفاع ۲۵۰۰ متر از سطح دریا رشد و پرورش می‌یابد که اکثر آنها نهال‌های حاصل از بذر بوده و به همین دلیل تنوع زیادی را در صفات‌شان نشان می‌دهند. به منظور دستیابی به ژنتیپ‌های برتر، ارزیابی این ژنتیپ‌ها ضروری است. بررسی روابط همبستگی بین خصوصیات مختلف می‌تواند در این راه مؤثر باشد. طی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ با گزینش مقدماتی، تعداد ۲۵۰ درخت گردوی از مناطق مهم کشت گردو شهرستان تعیین شدند. با بررسی های بیشتر تعداد ۲۵ ژنتیپ که از لحاظ صفات کمی و کیفی خصوصیات بهتری داشتند جهت انتخاب شدند. مطالعه همبستگی روی این ۲۵ ژنتیپ حاکی از آن بود که یک همبستگی منفی معنی دار بین ارتفاع محل با درصد چربی مغز دیده می‌شود. در این بررسی همچنین بین ارتفاع محل با طول میوه، طول مغز و شاخص اندازه میوه، همبستگی مثبت معنی دار مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که یک همبستگی بالا بین اکثر شاخص‌های اندازه گیری میوه و مغز وجود دارد. در این بررسی وجود میزان پروتئین کمتر و چربی بالاتر در برخی از ژنتیپ‌ها می‌تواند مؤید رابطه‌ی منفی بین این دو خصوصیت باشد. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام وزن مغز با سایر صفات کمی نشان داد که صفات وزن میوه، ضخامت پوست، درصد مغز، ضخامت مغز و طول میوه با ضریب تبیین ۸۷ درصد بیشترین تغییرات وزن مغز را توجیه نمودند. با مقایسه ضریب رگرسیونی و ضرایب همبستگی معلوم شد که وزن میوه با طول میوه رابطه مثبت و معنی دار و با ضخامت پوست رابطه منفی و معنی دار دارد.

کلمات کلیدی : گزینش، همبستگی، ارتفاع، وزن میوه، وزن مغز

مقدمه

گردو در عرض جغرافیایی ۳۹-۲۹ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۴۵ تا ۶۴ درجه شرقی از زمینهای کم ارتفاع تا مناطقی با ارتفاع ۲۵۰۰ متر، بصورت اهلی یا وحشی در شمال، غرب و مرکز ایران یافت می‌شود. شارما و همکاران با مطالعه صفات مورفو‌لوزیک کمی، همبستگی بین برخی از صفات میوه را تعیین کرد (۳). ژرمن همبستگی بالایی را بین زمان برگدهی نهال‌های یک گردو در خزانه و این پارامتر در چندین سال بعد روی درختان حاصل گزارش نموده که حاکی از امکان پذیری غربال اولیه ارقام مقاوم به سرما در خزانه است (۲). عاطفی یک همبستگی مستقیم بین ارتفاع از سطح دریا و مقاومت ارقام به سرمای دیررس را در ژنتیپ‌های گردوی ایرانی گزارش نموده است (۱). بررسی روابط همبستگی بین صفات مختلف در جمعیت مورد مطالعه، موضوع مورد بحث در این مقایسه می‌باشد.

مواد و روشها

این تحقیق در ۸ روستای گرد و خیز شهرستان خلخال بین ۳۷-۴۱ درجه عرض شمالی و ۳۹-۴۸ درجه طول شرقی در ارتفاع بین ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ متر طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ انجام گرفت. متوسط بارندگی ۳۵۰ الی ۴۰۰ میلی متر و متوسط دما $\frac{7}{4}$ و حداقل دما $-31/5$ و حداکثر آن ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد. برای تجزیه داده ها از روش های آماری چند متغیره استفاده گردید. برای این منظور هر ژنتیپ به عنوان تیمار و صفاتی که بر روی هر ژنتیپ به صورت مقایسه ای با ژنتیپ دیگر مطالعه می شود عنوان تکرار به حساب آمد (همه ژنتیپ ها درختان بذری بودند) و تجزیه واریانس یکطرفه داده ها در قالب طرح کاملاً تصادفی (CRD) انجام شد. تجزیه همبستگی صفات و رگرسیون گام به گام وزن مفرز با سایر صفات کمی برای تعیین همبستگی صفات انجام شد. تجزیه به مؤلفه های اصلی با استفاده از میانگین ۱۴ صفت کمی صورت گرفت. برای محاسبات آماری از نرم افزارهای Excel و Spss استفاده گردید.

نتایج و بحث

الف- تجزیه همبستگی صفات: تجزیه همبستگی صفات نشان داد که طول میوه دارای همبستگی مثبت با عرض میوه ($0/417^{**}$)، قطر میوه ($0/415^{**}$)، شاخص اندازه میوه ($0/797^{***}$) طول مفرز ($0/887^{***}$)، وزن میوه ($0/367^{***}$)، وزن مفرز ($0/512^{***}$)، ارتفاع محل ($0/547^{***}$) و با درصد روغن مفرز همبستگی منفی ($-0/555^{***}$) می باشد. عرض میوه با قطر میوه ($0/845^{***}$) ، شاخص اندازه میوه ($0/881^{***}$)، عرض مفرز ($0/755^{***}$)، قطر مفرز ($0/531^{***}$)، وزن میوه ($0/698^{***}$)، وزن مفرز ($0/685^{***}$) دارای همبستگی مثبت معنی دار می باشد. قطر میوه با شاخص اندازه میوه ($0/837^{***}$)، عرض مفرز ($0/804^{***}$)، قطر مفرز ($0/593^{***}$)، وزن میوه ($0/751^{***}$)، وزن مفرز ($0/639^{***}$) همبستگی مثبت نشان داد. شاخص اندازه میوه با طول مفرز ($0/617^{***}$)، عرض مفرز ($0/706^{***}$)، وزن میوه ($0/815^{***}$)، وزن مفرز ($0/717^{***}$) ارتفاع محل ($0/431^{***}$) همبستگی مثبت و با درصد مفرز رابطه منفی ($-0/333^{***}$)-نشان داد (میوه درشت نسبت به میوه کوچک وزن مفرز بیشتری دارد اما درصد مفرز پائین است). طول مفرز با وزن میوه ($0/548^{***}$)، وزن مفرز ($0/575^{***}$)، ارتفاع محل ($0/510^{***}$). همبستگی مثبت و با درصد روغن مفرز ($-0/557^{***}$) همبستگی منفی نشان داد. عرض مفرز با قطر مفرز ($0/470^{***}$)، وزن مفرز ($0/632^{***}$) همبستگی مثبت پیدا کرد. قطر مفرز با وزن میوه ($0/405^{***}$)، وزن مفرز ($0/585^{***}$) همبستگی مثبت نشان داد. ضخامت پوست با وزن میوه ($0/575^{***}$) همبستگی مثبت و با وزن مفرز ($-0/549^{***}$) همبستگی منفی نشان داد. وزن میوه با وزن مفرز ($0/737^{***}$) و با درصد مفرز ($-0/549^{***}$) دارای همبستگی معنی دار شد. ارتفاع محل با درصد روغن مفرز همبستگی منفی ($-0/720^{***}$)-نشان داد.

ب- نتایج حاصل از رگرسیون

در تجزیه رگرسیون گام به گام وزن مفرز به عنوان متغیر تابع (Y) و بقیه ای صفات به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند.

$$Y = -1/93 + 0/29(X1) - 0/77(X2) + 0/0191(X3) + 0/14(X4) + 0/4(X5)$$

وزن میوه ($X1$)، ضخامت پوست ($X2$)، درصد مفرز ($X3$)، ضخامت مفرز ($X4$) و طول میوه ($X5$)

وجود ضریب تبیین معنی دار در معادله رگرسیون نشان دهنده مؤثر بودن این صفات در افزایش وزن مفرز است. معادله فوق نشان داد که طول میوه و وزن میوه به ترتیب بیشترین تأثیر مثبت را بر روی افزایش وزن مفرز داشتند و با توجه به نتایج و مقایسه ضریب رگرسیونی و ضرایب همبستگی استنباط می شود که جهت افزایش وزن مفرز انتخاب بر مبنای طول میوه و وزن میوه و کاهش ضخامت پوست مؤثر است.

ج. تجزیه به مولفه‌های اصلی

تجزیه به مولفه‌های اصلی با استفاده از میانگین ۱۴ صفت کمی در طول سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ صورت گرفت.. مقادیر ویژه مولفه اصلی اول، دوم و سوم به ترتیب ۴۱، ۱۷ و ۱۴ درصد و در مجموع ۷۲ درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه نمودند. مقادیر نسبی ضرایب بردارهای ویژه در مولفه اول، نشان داد که صفات شاخص اندازه میوه، عرض و ضخامت میوه، ضرایب بردارهای ویژه بیشتری داشتند با توجه به ضریب مثبت بالا می‌توان نتیجه گرفت که صفات فوق با افزایش عملکرد ارتباط دارند. در مولفه دوم طول میوه و درصد چربی به ترتیب ضرایب بردارهای منفی و مثبت بیشتری داشتند. در مولفه سوم ضخامت پوست و درصد مغز ضریب بردار منفی و درصد چربی ضریب بردار مثبت بیشتری داشتند. ضرایب منفی ضخامت پوست، نشان دهنده رابطه منفی بین این صفت و درصد مغز می‌باشد.

منابع و مأخذ

- 1.Atefi,J.1990preliminary research of Persian walnut and correlation between pair characters. *Acta hort.*284:96-104
 - 2.Germain, e. 1990. Inheritance of leafing and lateral Bud Fruit Fullness in walnut (*Juglans regia L.*) phenotypic correlation Among some traits of trees. *Acta Hort.* 284: 125-134
 - 3.Sharma, O.C. and sharmas. S.D. , 2001; correlation between nut and kernel characters of Persian walnut seedling trees of Garsa valet in kullu district of Himachal Pradesh. *Acta Hort.*, 544: 129-132 Correlation analysis of various traits of walnut (*juglans regia L.*) genotypes in northwest of Iran (khalkhal region)
- By :H.zabihi,s.piri,A.imani and F.tavankar

Abstract

In north west of Iran (Ardabil province) walnut (*juglans regia L.*) growth in different altitude from low area until 2500 meter higher than sea level. In this area most of walnut trees growth from the seed and for this reason they showed many variety in their traits. In this way in investigation of correlation between of different characteristics can play an important role. in 2007 and 2008 primary evaluation was done in mentioned area and 250genotypes were selected. Further investigation in selected genotypes showed that 25 genotype showed better characteristics. correlation study on this 25 genotypes reveled that there was a significant negative correlation between altitude and nut fat content . also results indicated between altitude and nut length, kernel length ,from index and size index was a significant positive correlation .in this research existence of low level of protein and high level of fat in some genotypes could explain the negative correlation between this two traits. the results of regression's analysis, between the kernel weight and another quantitative traits , showed the traits nut weight , shell thickness, kernel percent , kernel thickness and nut length with the nomination of coefficient 87%,vindicated the maximum of variations kernel weight . the comparing between regression's coefficient and correlation coefficient revealed that nut weight with nut length had a significant positive correlation and with shell thickness had a significant negative correlation.

Key word: selection, correlation, altitude, nut weight, kernel weight.