

ارزیابی مقاومت سرماهی بهاره دورگه های امید بخش بادام

علی ایمانی، موسی رسولی، علیرضا رحیمی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

برای به دست آوردن ارقام دیر گل و مقاوم به سرما با خصوصیات رویشی و پرمولوژیکی مطلوب و صفات مناسب میوه یک برنامه دورگیگری بین ژنوتیپ های برتر انتخابی با ارقام دیر گل تجاری در سال ۱۳۷۶ انجام گرفت. در این تحقیق ۱۱۲۰ هیبرید از میان ۲۲ ترکیب مختلف به دست آمد. بذور از تلاقی ها جمع آوری و درگذان های پلاستیکی بعد از استراتیفیه کردن کشت شدند. بعد از یک سال نهال های هیبرید به باغ منتقل شدند. برای ارزیابی بیش از ۴۰ ژنوتیپی با استفاده از دیسکریپتور بادام (گولکان، ۱۹۸۲) مطالعه شد. در مراحل مختلف فنولوژیکی درختان هیبرید صفات رویشی وزایشی زیادی از جمله تاریخ گلدهی، شکل گلبرگ، رنگ گلبرگ، طول و عرض برگ، وزن میوه، دوقلویی مغز، وزن مغز، طول دمبرگ، وجود کرک روی برگ وغیره در آزمایشگاه و باغ اندازه گیری و یاد داشت برداری گردید. نتایج مطالعات اولیه در این تحقیق در طی سال های ۱۳۸۵، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ چندین هیبرید های گل را نشان داد. در ۱۳۸۴ به علت سرماهی دیر رس بهاره نه تنها بادام بلکه سایر درختان میوه از جمله سیب در ایستگاه به کلی آسیب دیدند. در ۵ و ۶ فروردین ماه سال ۸۴ سرماهی دیر رس بهاره با افت دمای ۵/۰ درجه سانتی گراد حادث شد. در این مرحله از میان بیش از هزار ژنوتیپ، ۵۶۱ ژنوتیپ به طور کامل آسیب دیدند. دوباره در ۱۶ و ۱۷ فروردین افت دمای ۲/۵ درجه سانتی گراد اتفاق افتاد و از میان ۵۵۹ ژنوتیپ سالم باقی مانده، ۷۶ ژنوتیپ به طور کامل آسیب ندیدند. بعد از ارزیابی ۷۶ ژنوتیپ، ۲۰ ژنوتیپ امید بخش بر اساس زمان گل دهی، مقاومت به سرما، عادت باردهی، میزان محصول و سلامت درخت برای ارزیابی تکمیلی انتخاب شدند. در سال ۸۵ تمام هیبرید ها گل دادند و گل دهی از ۱۶ اسفند شروع و در ۱۰ فروردین خاتمه یافت. گرچه گل های تعدادی از هیبرید ها در اثر سرماهی ۴- درجه

پنجمین کنگره علوم باگبانی ایران - شهریور ماه ۱۳۸۶ - دانشگاه شیراز

سانتی گراد در ۲۱ اسفند ماه ۸۴ وهم چنین در اثر سرماهی ۳/۳- درجه سانتی گراد در ۵ فروردین ماه ۸۵ آسیب دیدند و محصول ندادند با این حال تعداد ۲۰ ژنتیپ امید بخش و مقاوم به سرما گزینش شده در سال قبل نه تنها در اثر سرماهی های فوق آسیب ندیده بلکه از خصوصیات پومولوژیکی و عملکرد و تشکیل میوه (Fruit set) خوبی برخوردار بودند . به هر حال در این مقاله خصوصیات فنولوژیکی و پومولوژیکی ژنتیپ های امید بخش انتخابی ارائه شده است .