

مقایسه درصد قند، عملکرد و درصد ابتلا به سفیدک سطحی در دو روش تربیت پاچراغی و روسمی

محمد رجب زاده، محمد رضا رمضانی مقدم

مدیریت جهاد کشاورزی مه‌ولات

تاکستان‌های منطقه کاشمر عمده‌تا به روش پاچراغی تربیت شده‌اند، ولی متاسفانه بیماری سفیدک سطحی در باغات منطقه رایج بوده و هر ساله خسارات زیادی را به بغدادان وارد می‌کند. به منظور مقایسه روش تربیت پاچراغی با روش‌های تربیت ایستاده بوته انگور، آزمایشی در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با ۴ نکرار انجام شد. صفات مورد بررسی در این تحقیق عبارت بودند از: درصد قند (TSS)، عملکرد و درصد ابتلا به سفیدک سطحی، رقم انگور مورد بررسی رقم پیکانی (رقم انگور غالب منطقه) استفاده شده است. سیستم‌های تربیت مورد بررسی روش پاچراغی متداول منطقه و سیستم روسمی دو سیمه و دارای بازو یا کوردون بوده است. نتایج نشان داد که درصد ابتلا به بیماری سفیدک سطحی درسیستم ایستاده به دلیل تهیه بهتر به طور معنی داری نسبت به روش پاچراغی کاهش داشته است. درصد قند به طور متوسط در تمام مراحل رشد و رسیدن میوه ۱-۲ درصد بالاتر از روش پاچراغی بود و تفاوت معنی داری بین سیستم‌ها از لحاظ عملکرد کل مشاهده نشد.