

بررسی تأثیر محلولپاشی با بر در تنک نارنگی کینو

حامد حسن زاده خانکهدانی، عبدالحسین ابوطالبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

تنک میوه به منظور کاهش سال آوری و افزایش اندازه میوه یکی از عملیات باگبانی مورد نیاز برای ارقام مختلف نارنگی خصوصاً کینو می باشد. بدین منظور آزمایشی به صورت محلولپاشی غلظت‌های صفر، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ میلی گرم در لیتر بر قبل از شروع گلدهی روی درختان ۸ ساله نارنگی کینو انجام گرفت. براساس نتایج، تیمارها هیچ تأثیر معنی داری بر افزایش سطح بر در برگ نداشتند و کیفیت میوه شاخمه‌ای محلولپاشی شده همانند سایر شاخه‌ها بود. تعداد میوه و وزن کل میوه درختان تیمار شاهد به طور معنی‌داری بیشتر از درختان تیمار شده بود ولی درصد بالایی از میوه درختان شاهد ریز بودند. به طور کلی تیمارهای ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ بر باعث کاهش معنی دار در تعداد میوه شده و اندازه میوه در این تیمارها با اختلاف معنی دار بیشتر از سایر تیمارها بود.