

معرفی چند گیاه بومی با قابلیت کاربرد آنها به عنوان گیاه زینتی جدید از استان گیلان

محمد نفی پاداشت دهکایی^۱

۱- ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان

در جهان استفاده از گیاهان بومی به عنوان گیاهان زینتی جدید مورد توجه قرار گرفته است. ایران از تنوع گیاهی قابل توجهی برخوردار است و استان گیلان نیز با توجه به گوناگونی آب و هوایی از دشت تا کوهستان گیاهان زیبایی را در خود جای داده است که می توانند ارزش زینتی داشته باشند. گل استکانی با نام علمی *Boiss Campanula odontosepala* دارای گل های بنفش متمایل به آبی بوده و دوره گلدهی آن در منطقه لونک سیاهکل از اوخر بهار تا اوخر تابستان می باشد و قابلیت کاربرد به عنوان گل گلدهای را دارد. شاهدانه و ش با نام علمی *Datisca cannabina L.* که دارای برگ های بزرگ و شانه ای با ۳-۵ زوج برگجه و سر نیزه ای، گل بدون گلبرگ و به صورت مجتمع در خوش های بلند محوری می باشد. گلدهی در اردیبهشت تا خرداد صورت می گیرد و نظر به طول عمر مناسب می توان از آن به عنوان گیاه شاخه بریده سیز استفاده نمود. سنبل کوهی یا بهارک خزری با نام علمی *Wendelbo Corydalis hyrcana* گیاهی کوتاه غده ای پایا با ۱-۲ برگ و متنه به خوش ای با گل های زرد و زیبا، برگ سه قسمتی با تقسیمات دمبرگ دار، زمان گلدهی در اواسط فروردین ماه می باشد. این گیاه در منطقه داماش عمارلو رو دبار جمع آوری شده و با توجه به کوتاهی آن می توان به عنوان گیاه گلدهای مورد استفاده قرار داد. زنبق سوخته دار با نام علمی *Iris reticulata M. B.* گیاهی دائمی، دارای سوخته و ساقه کوتاه به ارتفاع ۱۵-۱۵ سانتی متر، برگ ۳-۱ عدد و گل به رنگ بنفش یا آبی است. در منطقه داماش رو دبار در اواسط فروردین به گل می رود. سوخته دارای پوشش هستند و با توجه به کوتاهی ساقه گل، گیاه مناسبی برای

برورش به عنوان گیاه گلدار است. نجم آبی گیلانی یا قفقازی با نام علمی *Scilla sibirica* Haw گیاهی پایا با سوخت متوسط، ساقه به طول ۲۰-۳۰ سانتی متر و گل آبی کمرنگ و زمان گلدهی فروردین و اردیبهشت است. این گیاه در مسیر جاده سیاهکل به دیلمان به فراوانی یافت می‌شود. با توجه به کوتاهی آن، به عنوان گل گلداری گلدار و همچنین مثل بسیاری از گیاهان سوخت دار دیگر می‌توان در پارک‌ها و فضای سبز کشت نمود. سیاه تلو با نام علمی *Paliurus spina-christi* Miller یک گونه در خجه‌ای تیغ‌دار و گل آذین به صورت خوش‌های کوتاه محوری، میوه مدور، خشک و غیر شکوفا و قبل از رسیدن زرد رنگ و زیبا بوده و زمان گلدهی در اردیبهشت و خرداد است. با توجه به پراکنش این گیاه از منطقه ساحلی تا مناطق کوهستانی و رشد در شرایط نامساعد قابلیت کاربرد در پارک‌ها و فضای سبز شهرها دارد.