

تاثیر زمان و مقادیر مختلف هرس سبز بر روی صفات کمی و کیفی انگور سلطانی در سیستم کوردن و خوابیده

حکیمی، جواد

بخش نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه

به منظور مطالعه تاثیر سطوح مختلف زمان و شدت هرس سبز بر روی صفات کمی و کیفی انگور سلطانی در سیستم کوردن و خوابیده ۲ آزمایش فاکتوریل 4×2 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه کهریز پیاده شد. آزمایش اول در سیستم کوردن و آزمایش دوم در سیستم خوابیده بود. فاکتور زمان هرس سبز در ۲ سطح (۷-۴

روز قبل از گلدهی و شروع مرحله رسیدن) و فاکتور مقدار هرس سبز در ۴ سطح (بدون هرس سبز، حذف سرشاخه‌ها از روی ۹ گره بالاتر از آخرین خوشه، حذف سرشاخه‌ها از روی ۵ گره بالاتر از آخرین خوشه و حذف سرشاخه‌ها یک گره بالاتر از آخرین خوشه) پیاده گردید. در سیستم کوردن تیمارهای زمان و مقادیر مختلف هرس سبز بر روی عملکرد و میزان pH بی تاثیر بوده ولی تیمار مقادیر هرس سبز بر روی میزان قند حبه‌ها در سطح ۱٪ موثر بود. همچنین تیمار زمان هرس سبز بر روی میانگین وزن حبه‌ها تاثیر مثبت داشته است. در سیستم خوابیده تیمارهای زمان و مقادیر مختلف هرس سبز بر روی عملکرد، مقدار قند و میزان pH بی تاثیر بوده ولی بر روی میانگین وزن حبه‌ها موثر بود.