

بررسی و مقایسه عملکرد ارقام گوجه فرنگی در استان آذربایجان غربی

هناوه، مهشید

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی

گوجه فرنگی یکی از سبزیجاتی است که دارای ارقام متعددی بوده و هر ساله ارقام جدیدی تولید و معرفی می شوند. این ارقام از لحاظ صفات مختلف دارای اختلافات زیادی بوده که مقایسه آنها به منظور مصارف مختلف ضروری به نظر می رسد. در این راستا و به منظور دستیابی به رقم یا ارقام با عملکرد بالا و سایر صفات مورد نظر، چندین رقم گوجه فرنگی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهبریز در یک طرح بلوك های کامل تصادفی با چهار تکرار باهم مقایسه شدند.

نتایج نشان داد که ارقام مورد نظر از لحاظ صفات مختلف دارای تفاوت های زیادی می باشند. در صفات عملکرد در هکتار، تعداد میوه در هر بوته، وزن، طول، قطر، مواد جامد محلول و pH میوه اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱٪ بین ارقام مشاهده شد. رقم فائونا با ۱۱۰ تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد و محلی ارومیه با ۸۲/۵ تن دارای کمترین عملکرد بود. متوسط تعداد میوه در هر بوته در رقم پوسا آبهار، وزن متوسط میوه در محلی ارومیه، طول میوه در کال جی ان ۳، قطر میوه در محلی ارومیه، مواد جامد محلول در مارگلوب ۲۰۰-۹ و pH در اف دی تی ۲۰-۲ بیشتر از سایر ارقام بود. رقم T13 زودرس ترین و محلی ارومیه دیرس ترین رقم شناخته شد. ارقام تخم مرغی شکل (T6, T11, Rیوگرند و کال جی ان ۳) به پوسیدگی گلگاه و ارقامی با میوه نرم و ابکی (محلی ارومیه، امپریال، روور و پوسا آبهار) به ترکیدگی میوه حساسیت بیشتری داشتند. در نهایت رقم فائونا با عملکرد بیشتر و سازگاری بهتر به آب و هوای منطقه به عنوان رقم بهتر انتخاب گردید.